



Bướm khế

Tên tiếng Việt: Bướm khế, Ngài át-lát

Tên tiếng Anh: Atlas Moth

Tên La tinh: *Attacus atlas*

Mức độ bị đe dọa: Không có tên trong Sách Đỏ Việt Nam, xếp bậc Hiếm (R) trong Sách Đỏ Thế giới IUCN.

Chiều dài sải cánh: 25–30cm.

Mô tả: Bướm khế là loài bướm đêm (ngài) có kích thước lớn nhất ở nước ta và trên thế giới. Bướm đực có đôi râu (ăng ten) dạng lược kép đặc trưng. Đây cũng là đặc điểm phân biệt bướm đêm và bướm ngày. Ở bướm ngày, đôi râu thường có chùy nhỏ ở chót râu. Trong khi ở bướm đêm, đôi râu có thể có nhiều dạng như lược kép, sợi chỉ, chiếc lá...và không có dạng chùy ở chót râu.

Thức ăn: Lá của nhiều cây như khế, quế, ổi, măng cầu...

Tập tính: Bướm khế sống ở rừng và vườn cây ăn quả tại cả vùng núi và vùng đồng bằng. Loài này hoạt động chủ yếu về đêm. Chúng rất thích ánh sáng, nên thường bay đến những nhà có ánh sáng đèn để đậu và đẻ trứng.

Sinh sản: Đến mùa sinh sản, Bướm khế cái tiết ra một chất pherô-môn hấp dẫn con đực. Sau khoảng 4-6 giờ giao phối, con cái đẻ một số lượng lớn trứng hình cầu có đường kính 2,5mm ở mặt dưới lá hoặc trên vỏ cây. Sâu bướm nở sau khoảng 2-3 tuần và ăn lá cây cho đến khi đạt chiều dài khoảng 11,5cm, chúng phát triển thành nhộng. Nhộng phát triển thành bướm sau khoảng 4 tuần. Đôi khi giai đoạn nhộng của thể kéo dài đến 1,5 năm.

Bướm khế có thể đẻ 250-290 trứng mỗi lần. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, chỉ có 4 con sâu bướm sống sót để thành nhộng, và khoảng 2 con nhộng phát triển thành thành bướm.



Bản đồ này không thể hiện ranh giới lãnh thổ Việt Nam.

Phân bố: vùng rừng núi và đồng bằng khắp cả nước.

Mối đe dọa

- Ô nhiễm môi trường do sử dụng thuốc trừ sâu, diệt cỏ trong nông nghiệp, cùng với sự thu hẹp diện tích rừng khiến Bướm khế và các loài bướm mất nơi ở và nguồn thức ăn.
- Màu sắc đẹp và kích thước lớn, Bướm khế bị truy lùng để trao đổi, buôn bán làm các bộ mẫu sưu tập với giá cao trong và ngoài nước.

Hành động của học sinh

- Không sờ chạm, mua bán, trao đổi Bướm khế và các mẫu vật bướm không rõ nguồn gốc.
- Nói với cha mẹ, bạn bè và mọi người xung quanh về việc bảo vệ Bướm khế và các loài bướm khác.
- Không xả rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh, môi trường. Tham gia các hoạt động bảo vệ rừng.
- Không tiếp tay cho các hành động phá rừng.

Bướm khế trưởng thành chỉ sống khoảng 2 tuần. Trong suốt thời gian đó, chúng không ăn mà chỉ sử dụng chất béo dự trữ từ giai đoạn sâu bướm. Chúng giao phối, đẻ trứng và chết ngay sau đó. Bướm đực chết sau khi giao phối, Bướm cái chết sau khi đẻ trứng.

Ảnh: WAR/Bùi Hữu Mạnh

Xây dựng:
Đỗ Thị Thanh Huyền
Hà Thị Kim Loan
Lê Thị Kim Ngân
Thiết kế:
Đỗ Thị Thanh Huyền

Cố vấn:
Nguyễn Thị Khôi
Đào Hữu Mạnh
Lê Xuân Lâm
Tháng 11/2013

www.wildlifeatrisk.org
Email: info@wildlifeatrisk.org



Đường dây nóng
Tổ chức Bảo vệ Động vật hoang dã - WAR
097 606 7646

WAR
WILDLIFE AT RISK

