



## Bọ lá

Tên tiếng Anh: Linnaeus' Leaf Bug

Tên La tinh: *Phyllium siccifolium*

Mức độ bị đe doạ (Sách Đỏ Việt Nam): Sẽ nguy cấp-VU

**Mô tả:** Hình dạng giống chiếc lá

**Chiều dài:** 9,5cm

**Thức ăn:** Lá một số cây thuộc họ xoài, bạch đàn, xoài, ôi, hoa hồng...

### Tập tính

Bọ lá thường sống trên cách cành cây trong rừng ẩm nhiệt đới, kiếm ăn ban đêm. Với hình dạng giống chiếc lá, Bọ lá dễ dàng ngụy trang, hòa lẫn mình vào thiên nhiên nhằm tránh kẻ thù và các loài chim săn mồi. Bọ lá đặc có thể bay từ cây này sang cây khác.

Bọ lá biến thái không hoàn toàn. Trứng nở ra thiếu trùng có hình dạng giống con trưởng thành nhưng cánh chưa phát triển. Sau nhiều lần lột xác, cánh phát triển và trở thành Bọ lá trưởng thành. Quá trình này mất 5-6 tháng. Sau lần lột xác cuối cùng khoảng 3-4 tuần, cá thể cái trưởng thành bắt đầu đẻ trứng.

### Sinh sản

Bọ lá đẻ từng quả trứng rời rạc. Trứng nở sau 5-6 tháng. Một cá thể Bọ lá có thể đẻ tới 150 trứng trong suốt cuộc đời.

Bọ lá còn được gọi là "chiếc lá di động" vì khả năng ngụy trang hoàn hảo của chúng. Không có thể phát hiện ra Bọ lá khi chúng nằm yên trên lá cây. Chúng có thể bất động đến vài giờ đồng hồ. Khả năng ngụy trang hoàn hảo này giúp Bọ lá sinh tồn và phát triển trong môi trường hoang dã.



Phân bố: Vùng rừng các tỉnh Lào Cai, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Ninh Bình, Hà Tây.

### Mối đe doạ

Số lượng Bọ lá rất biến động theo từng thời kỳ hoặc khu vực được bảo tồn. Hiện nay, Bọ lá bị đe doạ bởi 2 nguyên nhân sau:

- Sự suy thoái và thu hẹp diện tích rừng khiến Bọ lá mất nơi sinh sống.
- Bị truy lùng, sưu tầm làm mẫu vật với giá cao do có hình thái và màu sắc đẹp.

### Hành động của học sinh

- Không sưu tầm, mua bán, trao đổi Bọ lá và mẫu vật của chúng.
- Nói với gia đình, bạn bè và những người xung quanh về việc bảo vệ Bọ lá.
- Không xả rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh môi trường.
- Không tiếp tay cho các hành động phá rừng. Tham gia các hoạt động bảo vệ rừng.

Ảnh: WAR