



Ếch cây kio

Bản đồ này không thể hiện ranh giới lãnh thổ Việt Nam.



Tên tiếng Việt: Ếch cây kio

Tên tiếng Anh: Black-webbed Tree Frog

Tên La tinh: *Rhacophorus kio*

Mức độ bị đe doạ (Sách Đỏ Việt Nam): Nguy cấp - EN

Chiều dài thân: 6-8cm.

Thức ăn

Các loại động vật trên cây như sâu non, kiến, ong và các loài côn trùng khác thuộc bộ cánh màng.

Tập tính

Ếch cây kio sống trong các khu rừng ở vùng trung du và miền núi đến độ cao 1500m; kiếm ăn ban đêm, ban ngày ẩn trong các bụi cây. Loài này ghép đôi vào những đêm mưa, khi đó con cái thường cõng con đực leo lên các cành cây ven hồ và giao phối từ 1- 4 giờ.

Sinh sản

Ếch cây kio sinh sản từ tháng 4 đến tháng 8. Trứng đẻ ra được thụ tinh ngay, sau đó được cuộn vào lá cây tạo thành những ổ bọt dài 18 - 22cm, treo lơ lửng cách mặt nước 0,5 - 1m. Nòng nọc nở trong ổ bọt và rơi vào trong nước.

Mối đe doạ

- Ếch cây kio là loài quý hiếm, bị đe doạ tuyệt chủng ở mức nguy cấp do mất rừng làm mất nơi sinh sống của loài.

Hành động của học sinh

- Không tiếp tay cho các hành động phá rừng như khai thác gỗ và lâm sản trái phép, phá rừng làm nương rẫy, xây dựng cơ sở hạ tầng...
- Nói với mọi người về việc bảo vệ rừng, bảo vệ Ếch cây kio và các loài lưỡng cư khác.
- Tham gia các hoạt động bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường. Không xả rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh, môi trường.

Ếch cây kio còn được gọi là "ếch bay" do chúng có thể chuyển từ các cành cây cách nhau tới 2-3m, hoặc liêng từ cây cao 3-5m xuống mặt hồ để ghép đôi trong mùa sinh sản. Khả năng "bay" này là do Ếch cây kio có cấu tạo màng chân lớn, và nếp da bên cánh tay rộng.

Ảnh: WAR/Nguyễn Vũ Khởi

Xây dựng
Đỗ Thị Thành Huyền
Hồ Thị Kim Lan
Lê Thị Kim Ngân

Thiết kế
Đỗ Thị Thành Huyền

Cố vấn
Nguyễn Vũ Khởi
Bùi Hữu Mạnh
Lê Xuân Lâm

Tháng 11/2013

www.wildlifetrisk.org

Email: info@wildlifetrisk.org



Dường dây nóng
Tổ chức Bảo vệ Động vật hoang dã - WAR
097 606 7646

WAR
WILDLIFE AT RISK

