



# Sói đỏ

**Tên tiếng Việt:** Sói đỏ, Sói lửa

**Tên tiếng Anh:** Dhole

**Tên La tinh:** *Cuon alpinus*

**Mức độ bị đe doạ** (Sách Đỏ Việt Nam):

Nguy cấp-EN

**Chiều dài đầu thân:** Đến 90cm, đuôi dài hơn 30cm.

**Cân nặng:** Đến 25kg.

**Thức ăn:** Ăn thịt tươi sống các loài như nai, hươu, hoẵng, lợn rừng, trâu, bò, lợn, gà, dê, ngựa và các loài chim lớn.

## Tập tính

Sói đỏ săn mồi ban đêm, kiếm ăn tích cực nhất vào lúc sáng sớm hoặc chiều tối..

Chúng không sống cố định trong một khu vực mà luôn di chuyển trên diện rộng và thường cư trú ở những khu rừng già.

Sói đỏ sống từng đôi hoặc đàn 5 - 7 con, khi săn mồi có thể đến 50 con. Trong đàn, nếu có Sói đỏ bị thương, các con Sói khác mang thức ăn về chia sẻ. Nếu một con chó sói chết thì những con chó sói khác trong bầy sẽ chăm sóc con của nó.

**Thời gian mang thai:** Khoảng 63 ngày.

## Sinh sản

Mùa sinh sản của Sói đỏ thường vào tháng 11 đến tháng 2 năm sau. Mỗi năm thường sinh sản từ 1 đến 2 lần, mỗi lứa đẻ từ 2 đến 4 con.

Ảnh: WAR/Nguyễn Vũ Khởi

Xây dựng  
Đô Thị Thanh Huyền  
Hồ Thị Kim Lam  
Lê Thị Kim Ngân

Thiết kế  
Đô Thị Thanh Huyền

Cố vấn  
Nguyễn Vũ Quốc  
Bùi Hữu Mạnh  
Lê Xuân Lâm

Tháng 11/2013



**Phân bố:** Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, Bắc Cạn, Quảng Trị, Bình Định, Kon Tum, Gia Lai.

## Mối đe doạ

- Bị săn bắt lấy da lông làm thời trang, lấy thịt ăn và lấy các bộ phận khác làm vật trang trí.

- Môi trường sống bị thu hẹp và chất lượng thức ăn giảm đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến số lượng sói đỏ ngoài tự nhiên.

## Hành động của học sinh

- Không sử dụng, không mua bán những sản phẩm trái phép từ Sói đỏ.
- Nói với gia đình, bạn bè và những người xung quanh về việc bảo vệ Sói đỏ.
- Thông báo với các cơ quan chức năng khi thấy Sói đỏ bị mua bán, vận chuyển, săn bắt trái phép.
- Không xả rác bừa bãi, không tiếp tay cho các hành động phá rừng làm mất nơi ở và nguồn thức ăn của Sói đỏ.

## Sói đỏ - "Sát thủ bầy đàn".

Một con Sói đỏ có thể vô hại, nhưng cả một đàn Sói đỏ lại là mối đe dọa khủng khiếp với nhiều loài thú lớn và khó săn như lợn rừng hay bò tót... Chúng dùng chiến thuật quây quanh và vờn rồi đớp thịt ở mông, ở đùi khiến con mồi mất máu nhiều, kiệt sức và gục ngã.